

ESPAÑA tiene una de las **incidencias más elevadas** en Europa Occidental de **VIH**



18% INFRADIAGNÓSTICO
(25.000 personas)



48% DIAGNÓSTICO TARDÍO

VIH



+50% de Pacientes con VIH > 50 AÑOS



50% con PROBLEMAS RENALES y/o CARDIOVASCULARES



36% Encuestados consideran que TIEMPO ENTRE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO: MUY ELEVADO

EJES DE ACTUACIÓN



CONCIENCIACIÓN

1. Impulsar la efectividad de las campañas de prevención y concienciación teniendo en cuenta el impacto del medio sobre el colectivo objetivo.

DIAGNÓSTICO

1. Sensibilizar respecto del impacto en incidencia del infradiagnóstico.
¿Quién?
Persona 20-59 años sexualmente activa.
¿Cuándo?
Mín. 1 vez aprovechando extracción de sangre, o cuando haya exposición/conducta de riesgo.
2. Implementar la política de cribado.
3. Reducir el tiempo entre diagnóstico y tratamiento.

ATENCIÓN INTEGRADA DEL PACIENTE VIH

Medidas para evitar o retrasar envejecimiento prematuro, comorbilidad y mortalidad.

- Potenciar hábitos de vida saludable.
- Actuar sobre factores de riesgo modificables.
- Mejorar el perfil de tolerabilidad del tratamiento.
- Inicio precoz del TAR.
- Refuerzo del seguimiento periódico e integral.



Mejora de resultados en los tratamientos




Aumento de la esperanza de vida



Cronificación de la patología

INCLUSIÓN DE **4** OBJETIVO 90 para la **MEJORA DE SALUD GLOBAL CALIDAD DE VIDA**




Normalización de las Personas con VIH en la sociedad

Educación, actuaciones multidisciplinares y transversales, supresión de barreras laborales, económicas y sociales.

FACTOR CRÍTICO



Inversión e impulso estratégico continuado desde las AA.PP.



*Los retos actuales en
el abordaje del VIH*



**UNA VISIÓN
MULTIDIMENSIONAL**